


परिवार नियोजनका साधनहरूको तुलनात्मक प्रभावकारीता


बढी प्रभावकारी

(एक वर्षमा १०० महिला मध्ये ९% भन्दा कमको गर्भ रहने सम्भावना)

८८%



भ्यासेक्टोमी




मिनील्याप




कपर-टी/आइ.यु.सि.डी.



नरप्लाण्ट



डिपो सुई




पिल्स



कण्डम




स्तनपान विधि




प्राकृतिक परिवार नियोजनको विधि



विर्य स्खलन हुनु भन्दा पहिले लिङ्गलाई योनीबाट फिक्ने विधि



शुक्रकिटनासक



फिज चक्की

३०%

कम प्रभावकारी

(एक वर्षमा १०० महिला मध्ये करिब ३०% को गर्भ रहने संभावना)

साधनको प्रयोगलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ

सेवा प्रदान गरिसके पछि सम्झनु पर्ने थोरै कुराहरू

भ्यासेक्टोमी

बन्ध्याकरण गरेको ३ महिना सम्म अन्य कुनै अस्थायी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

डिपो सुई

प्रत्येक ३/३ महिना नबिराईकन लिनुपर्छ ।

पिल्स

प्रत्येक दिन नबिराईकन खानुपर्छ ।

कण्डम

प्रत्येक पटक सम्भोग गर्दा सहि तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

स्तनपान विधि

बच्चा जन्मेको ६ महिना सम्म पूर्ण रूपमा (रातमा पनि) स्तनपान मात्र गराउनुपर्छ ।

प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि

गर्भ रहन सक्ने सम्भावित दिनहरूमा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन वा कण्डम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विर्य स्खलन हुनु भन्दा पहिले लिङ्गलाई योनीबाट फिक्ने विधि

प्रत्येक पटक सम्भोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

शुक्रकिटनासक / फिज चक्की

प्रत्येक पटक सम्भोग गर्दा सहि तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र



