RECOURIR À UN CENTRE DE SANTÉ

Si vous avez:

- Des saignements abondants qui durent.
- Une capsule qui est expulsée ou impalpable.
- Gonflement, rougeur ou douleur au niveau de l'endroit de l'insertion.
- Des maux de tête très violents.
- Des troubles de la vue.

ALLEZ AU CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE !

RENDEZ-VOUS

Notez le jour que vous avez reçu votre méthode et le jour de votre prochain rendez-vous. Nous voulons que vous ayez confiance totale en votre méthode.

Reçu le

Jour	Mois	Année

Prochain rendez-vous le

Jour	Mois	Année

USAID DU PEUPLE AMERICAIN

Breakthrough ACTION
FAIRE AVANCER LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT

Amplify PF

Voici une méthode de planification familiale

L'IMPLANT

Pour l'harmonie et la stabilité de votre famille

CONFIANCE TOTALE

Planning Familiale: Qualité, Confidentialité, Assurance

L'implant est connu sous les noms Jadelle ou Implanon.

L'IMPLANT

JADELLE 

IMPLANON

1 QU´EST-CE QUE C'EST ?

Ce sont des bâtonnets en plastique qui contiennent des hormones et qui empêchent la survenue d'une grossesse. L'implant est inséré sous la peau, au niveau de la face interne du bras de la femme après une anesthésie locale par un agent de santé formé.

Vous devez palper chaque mois le site d'insertion pour constater la présence de votre implant.



Pour toute information rendez-vous au centre de santé le plus proche.

2 AVANTAGES

- Il convient à toutes les femmes en âge de procréer sauf contre-indication.
- Il peut être inséré à n'importe quel moment du cycle si on est raisonnablement sûr que vous n'êtes pas enceinte. Il ne gêne pas l'allaitement.
- L'implant est efficace dans les 24 heures qui suivent son insertion; il vous protège de la grossesse pendant 5 ans (Jadelle) ou 3 ans (Implanon), mais vous pouvez le faire retirer à tout moment.
- Dès que vous faites retirer l'implant, vous pourrez tomber enceinte.

Attention : L'implant ne vous protège pas contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et le VIH/sida !

3 EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- Une absence des règles.
- Des saignements de temps en temps.
- Une prise ou perte du poids.

Ce n'est pas grave. Tout cela cessera avec le temps! Dans tous les cas, consultez un agent de santé qualifié.

© 2020 Johns Hopkins University. Tous droits réservés.
Les informations sont adaptées du document Planification familiale : un manuel à l'intention des prestataires de services du monde entier accessible sur www.fphandbook.org