



## RECOURIR À UN CENTRE DE SANTÉ

### Si vous avez:

- Des saignements abondants qui durent.
- Une capsule qui est expulsée ou impalpable.
- Gonflement, rougeur ou douleur au niveau de l'endroit de l'insertion.
- Des maux de tête très violents.
- Des troubles de la vue.

**ALLEZ AU CENTRE DE SANTÉ LE  
PLUS PROCHE !**

## RENDEZ-VOUS

Notez le jour que vous avez reçu votre méthode et le jour de votre prochain rendez-vous. Nous voulons que vous ayez confiance totale en votre méthode.

### Reçu le

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jour	Mois	Année

### Prochain rendez-vous le

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jour	Mois	Année

Voici une méthode de  
planification familiale

# L'IMPLANT

Pour l'harmonie  
et la stabilité de  
votre famille



**CONFIANCE  
TOTALE**

Planning Familiale: Qualité, Confidentialité, Assurance

L'implant est connu sous  
les noms Jadelle ou  
Implanon.





## 1 QU'EST-CE QUE C'EST ?

Ce sont des bâtonnets en plastique qui contiennent des hormones et qui empêchent la grossesse. L'implant est inséré sous la peau, au niveau de la face interne du bras de la femme après une anesthésie locale par un agent de santé formé.

Vous devez palper chaque mois le site d'insertion pour constater la présence de votre implant.

**Pour toute information rendez-vous au centre de santé le plus proche.**



## 2 AVANTAGES

- Il convient à toutes les femmes en âge de procréer sauf contre-indication.
- Il peut être inséré à n'importe quel moment du cycle si on est raisonnablement sûr que vous n'êtes pas enceinte. Il ne gêne pas l'allaitement.
- L'implant est efficace le jour de son insertion, lorsque cette insertion se fait dans les 7 jours qui suivent le début des règles. Il vous protège de la grossesse pendant 5 ans (Jadelle) ou 3 ans (Implanon), mais vous pouvez le faire retirer à tout moment.
- Dès que vous faites retirer l'implant, vous pourrez tomber enceinte.

**Attention : L'implant ne vous protège pas contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et le VIH/sida !**

## 3 EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- Une absence des règles.
- Des saignements de temps en temps.
- Une prise ou perte du poids.

**Ce n'est pas grave. Tout cela cessera avec le temps! Dans tous les cas, consultez un agent de santé qualifié.**